

APL204寛解導入(D-A群)療法(Day1)

【血液内科】176-1【急性前骨髄球性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/	
キロサイド	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
イダマイシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方で別オーダー
※①	10時	アプレピタントCap125mg 1Cap
※①	10時	グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●イダマイシン【 】mg 注射用水 生食 100mL 30分 ※イダマイシン1V当り注射用水5mLで溶解
③	11時	●キロサイド【 】mg 生食 500mL 24時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
キロサイド	100mg/m ²	mg/Body
イダマイシン	12mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

○アントラサイクリン系薬剤では、一般に蓄積性の心毒性が発現するため、総投与量に注意して投与すること。

(海外添付文書: イダマイシンの総投与量は120mg/m²を超えてはならない)

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師