

ガザイバ+カルケンス療法【1コース目】(Day2)

【血液内科】209-2

【慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする						
Day	1	2	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	
ガザイバ		↓	↓	↓	休薬	
カルケンス	経口: 先行して28日間投与		経口: Day1-28			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 6時間
※①	10時	同時に側管より カロナル内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A プレドニン注20mg 5A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●ガザイバ【 】mg 生食 250mL 投与速度は「■注意事項」参照 ※Day1、Day2 2日間で1V使用

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ガザイバ	《Day1》 100mg/Body
	《Day2》 900mg/Body
	《Day8,15》 1000mg/Body
カルケンス(経口)	100mg/回 × 1日2回 ※Day1-28服用

■注意・確認事項

- カルケンスを28日間投与した後に併用療法として本レジメンのガザイバの投与を開始すること。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ガザイバ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- ガザイバ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- ガザイバの投与速度: Day2以降は30分毎に速度を速める
Day1: 25mL/hr ※投与速度は上げない
Day2: 10mL/hr ⇒ 25mL/hr ⇒ 40mL/hr ⇒ 55mL/hr ⇒ 65mL/hr ⇒ 80mL/hr ⇒ 95mL/hr ⇒ 110mL/hr
(適正使用ガイド投与速度一部改変)
Day8及びDay15: 25mL/hr ⇒ 50mL/hr ⇒ 75mL/hr ⇒ 100mL/hr
- 最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師