

ガザイバ+カルケンス療法【2コース目以降】

【血液内科】210

【慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	
ガザイバ	↓	休薬	休薬	休薬	
カルケンス	経口: Day1-28				

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ガザイバ	mg/m ² 1000mg/Body
カルケンス(経口)	100mg/回 × 1日2回 ※Day1-28服用

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ガザイバ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- ガザイバ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- ガザイバの投与速度: 30分毎に速度を速める(最終的に100mL/hrまで)
25mL/hr ⇒ 50mL/hr ⇒ 75mL/hr ⇒ 100mL/hr
- 最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師