

# ビキセオス寛解導入療法【1コース目】(Day5)

■エンボス

## 【血液内科】218-5【急性骨髄性白血病】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |


■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

| Day   | 1 | 3 | 5 | ~ |
|-------|---|---|---|---|
| 施行日   | / | / | / |   |
| ビキセオス | ↓ | ↓ | ↓ |   |

※次治療

- ・寛解導入【2コース目】: 2~5週後
- ・地固め : 5~8週後

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量

※投与量の参考

| 薬剤名   | 標準投与量                           |
|-------|---------------------------------|
| ビキセオス | 100 ユニット/m <sup>2</sup> mg/Body |

※100ユニット = ダウノルビシン44mg + シタラビン100mg 配合

■注意・確認事項

- 輸液ポンプを使用し、中心静脈から投与すること。
- インラインフィルターは使用しないこと。
- ダウノルビシンは総投与量25mg/kgを超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |