

ビキセオス寛解導入療法【2コース目】(Day3)

■エンボス

【血液内科】219-3【急性骨髄性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :

Day	1	3	~
施行日	/	/	
ビキセオス	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 250mL 2時間30分
※①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダー 同時に側管より グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●ビキセオス【 】ユニット 注射用水 生食 500mL 1時間30分 ※ビキセオス1V(=100ユニット) 当り注射用水19mLで溶解 (溶解後濃度: 5ユニット/mL)

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ビキセオス	100 ユニット/m ² mg/Body

※100ユニット = ダウノルビシン44mg + シタラビン100mg 配合

■注意・確認事項

- 1コース目に寛解に到達しなかった患者で、ビキセオスへの忍容性が良好な患者が適応となる(最大2コースまで)。
- 1コース目投与開始から2~5週間までに開始する。
- 輸液ポンプを使用し、中心静脈から投与すること。
- インラインフィルターは使用しないこと。
- ダウノルビシンは総投与量25mg/kgを超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。
- アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師