

エルレフィオ療法【2週目まで】(Day4)**【血液内科】222-4【多発性骨髄腫】
(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	4	8	~14
施行日	/	/	/	/
エルレフィオ	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 500mL 24時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A オルガドロン注19mg 1V 生食 100mL 30分
②	11時	●エルレフィオ皮下注 32mg 皮下注射

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エルレフィオ	《Day1》 12mg/body 《Day4》 32mg/body 《Day8》 76mg/body

■注意・確認事項

○エルレフィオ投与によりサイトカイン放出症候群(CRS)が起こる場合があるので注意すること。
CRS予防のため、エルレフィオ投与開始1時間前に副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師