

**(ダラキューロ)DPd療法【1コース目】(Day1)**

**【血液内科】226-1【多発性骨髄腫】**

**(第 コース目)**

\*網かけ部分は必須記入事項


|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day        | 1           | 2 | 8    | 9 | 15   | 16 | 22   | 23 | ~28 |
|------------|-------------|---|------|---|------|----|------|----|-----|
| 施行日        | /           | / | /    | / | /    | /  | /    | /  | /   |
| ダラキューロ     | ↓ 休薬        |   | ↓ 休薬 |   | ↓ 休薬 |    | ↓ 休薬 |    |     |
| オルガドロン     | ↓ 休薬        |   | ↓ 休薬 |   | ↓ 休薬 |    | ↓ 休薬 |    |     |
| レナデックス(経口) | 休薬 ↓        |   | 休薬 ↓ |   | 休薬 ↓ |    | 休薬 ↓ |    |     |
| ポマリスト      | 経口: Day1-21 |   |      |   |      |    | 休薬   | 休薬 |     |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名        | 標準投与量                       | 参考                   |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| ダラキューロ     | 1回 1V (15mL)                | ※ダラツムマブとして1800mg     |
| オルガドロン     | mg/m <sup>2</sup> 19mg/Body |                      |
| レナデックス(経口) | mg/m <sup>2</sup> 20mg/Body |                      |
| ポマリスト(経口)  | mg/m <sup>2</sup> 4mg/Body  | ※Day1~Day21服用(7日間休薬) |

■注意・確認事項

○ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 入力薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|       |     |     |