

FLU+BU2療法(Day1,2,6)

【血液内科】236-1,2,6【同種造血幹細胞移植前処置】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :

Day	1	2	3	4	5	6	7	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
フルダラ	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	移植
ブスルフェクス	休薬	休薬	↓	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方別オーダー
①	10時	●フルダラ【 】mg 注射用水 生食 100mL ※フルダラ1V当り注射用水2.5mLで溶解 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
フルダラ	30 mg/m ² mg/Body
ブスルフェクス	3.2 mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- 痙攣予防として抗痙攣薬(レベチラセタム等)の投与を考慮すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師