

FLU+BU4療法(Day3,4)

【血液内科】237-3,4【同種造血幹細胞移植前処置】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :								
Day	1	2	3	4	5	6	7	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
フルダラ		↓	↓	↓	↓	↓	休薬	移植
ブスルフェクス	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	時間
		メイン輸液 ※臨時で別オーダー	
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap ➡ 別途内服オーダー デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL	30分
②	10時30分	●ブスルフェクス()mg 生食 適量 ※10倍量の生食に希釈(11倍希釈)	3時間
③	13時30分	生食 50mL	10分
④	13時40分	●フルダラ()mg 注射用水 生食 100mL ※フルダラ1V当り注射用水2.5mLで溶解	30分
⑤	22時	グラニセトンバッグ 100mL	30分

■投与量	※投与量の参考	
薬剤名	標準投与量	
フルダラ	30 mg/m ²	mg/Body
ブスルフェクス	3.2 mg/kg	mg/Body

■注意・確認事項

○中心静脈から投与すること。

○痙攣予防として抗痙攣薬(レベチラセタム等)の投与を考慮すること。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay3に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師