

■エンボス

Cy(+TBI)療法

【血液内科】239【同種造血幹細胞移植前処置】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :

Day	1	2	3	4	5	~
施行日	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	休薬	休薬	休薬	移植
TBI	休薬	休薬	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	投与量
		メイン輸液	※臨時処方で別オーダー
①	10時	デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL	30分
②	10時25分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL	全開
③	10時30分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL	3時間
④	14時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL	全開
⑤	18時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL	全開
⑥	22時	グラニセトロンバッグ 100mL	30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エンドキサン	60 mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- ウロミテキサンはエンドキサン投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。
- ウロミテキサンの1回量は24mg/kg

入力 薬剤師	看護師	看護師