

## Isa20+d療法(輸液半量)【1コース目】(Day1)

【血液内科】244-1【多発性骨髄腫】  
(第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

## ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day    | 1 | 8 | 15 | 22 | ~28 |
|--------|---|---|----|----|-----|
| 施行日    | / | / | /  | /  | /   |
| サークリサ  | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  |     |
| オルガドロン | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  |     |

## ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間   |                                                                                                                                                                               |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※①  | 10時    | 生食 250mL 20mL/hr(終了時残破棄)                                                                                                                                                      |
| ※①  | 10時    | 同時に側管より<br><div>           カロナール内服 → 別途内服オーダー<br/>           ポラミン注5mg 1A<br/>           ガスター注20mg 1A<br/>           オルガドロン注19mg 2V<br/>           生食 100mL 30分         </div> |
| ②   | 10時30分 | <div>           ●サークリサ【      】mg<br/>           生食 250mL         </div> 投与速度は「■注意事項」参照                                                                                        |

## ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量             |           |
|--------|-------------------|-----------|
| サークリサ  | 20mg/kg           | mg/Body   |
| オルガドロン | mg/m <sup>2</sup> | 38mg/Body |

◎75歳以上:19mg/body

## ■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- サークリサ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- サークリサの投与速度 (詳細は点滴速度換算表参照)

## ＜初回投与＞

|              |           |
|--------------|-----------|
| 投与開始0-60分    | 12.5mL/hr |
| 投与開始60-90分   | 25mL/hr   |
| 投与開始90-120分  | 37.5mL/hr |
| 投与開始120-150分 | 50mL/hr   |
| 投与開始150-180分 | 62.5mL/hr |
| 投与開始180分以降   | 75mL/hr   |

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |