

Isa20+d療法(輸液半量)【1コース目】(Day8)

【血液内科】244-8【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
サークリサ	↓	↓	↓	↓	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 250mL 20mL/hr(終了時残破棄)
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A ガスター注20mg 1A オルガドロン注19mg 2V 生食 100mL 30分
②	10時30分	●サークリサ【 】mg 生食 250mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サークリサ	20mg/kg	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	38mg/Body

◎75歳以上:19mg/body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- サークリサ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- サークリサの投与速度 (詳細は点滴速度換算表参照)

≪2回目投与≫

投与開始0-30分	25mL/hr
投与開始30-60分	50mL/hr
投与開始60分以降	100mL/hr

入力 薬剤師	看護師	看護師