■エンボス

Isa20+d療法(輸液半量)【2コース目以降】

【血液内科】245【多発性骨髄腫】

(第　コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長: cm	体重: kg
体表面積: ㎡	Cr: mg/dL

■レジメン　下記が1コースの投与スケジュール　:　4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	～28
施行日	／	／	／	／	／
サークリサ	↓	休薬	↓	休薬	
オルガドロン	↓	休薬	↓	休薬	
レナデックス(経口)	休薬	↓	休薬	↓	

■投与順序　※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食　250mL　20mL/hr(終了時残破棄)
※①	10時	カロナール内服(必要時) ➡ 別途内服オーダ 同時に側管より ← ポラタミン注5mg　1A　(必要時) ガスター注20mg　1A　(必要時) オルガドロン注19mg　2V 生食　100mL　30分
②	10時30分	●サークリサ【　　】mg 生食　250mL　2時間30分

■投与量　※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サークリサ	20mg/kg	mg/Body
オルガドロン	mg/m²	38mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m2	40mg/Body

◎75歳以上:19mg/body
◎75歳以上:20mg/body

■注意･確認事項
○点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
○サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
○サークリサ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
○1コース目においてinfusion reactionが認められなかった場合は、
　2コース目以降のサークリサ投与における前投薬の必要性を再検討することができる。
○サークリサの投与速度　**(詳細は点滴速度換算表参照)**
≪3回目投与以降≫
　100mL/hr

入力 薬剤師	看護師	看護師