

IsaKd療法【1コース目】(Day1)

【血液内科】246-1【多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	15	16	22	23	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
サークリサ	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
カイプロリス	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
レナデックス(経口)	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
※①	10時	5%ブドウ糖 250mL 20mL/hr(終了時残破棄)
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポララミン注5mg 1A ガスター注20mg 1A オルガドロン注19mg 1V 5%ブドウ糖 100mL 30分
②	10時30分	●サークリサ【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 投与速度は「■注意事項」参照
③	13時50分	5%ブドウ糖 50mL 10分
④	14時	●カイプロリス【 】mg 注射用水 5%ブドウ糖 100mL 30分 ※カイプロリス10mgは注射用水5mLで溶解 ※カイプロリス40mgは注射用水20mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
サークリサ	10mg/kg mg/Body
カイプロリス	《Day1,2》 20mg/m ² 《Day8,9,15,16》 56mg/m ²
オルガドロン	mg/m ² 19mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m ² 20mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
 - サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
 - サークリサ、カイプロリス投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意。
 - サークリサの投与速度 (詳細は点滴速度換算表参照)
- 《初回投与》

投与開始0-60分	25mL/hr
投与開始60-90分	50mL/hr
投与開始90-120分	75mL/hr
投与開始120-150分	100mL/hr
投与開始150-180分	125mL/hr
投与開始180分以降	150mL/hr

入力薬剤師	看護師	看護師