

## IsaKd療法【1コース目】(Day22)

【血液内科】246-22【多発性骨髄腫】  
(第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

## ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day        | 1  | 2  | 8  | 9  | 15 | 16 | 22 | 23 | ~28 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日        | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /   |
| サークリサ      | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |
| カイプロリス     | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |
| オルガドロン     | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |
| レナデックス(経口) | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  |     |

## ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※①  | 10時    | 5%ブドウ糖 250mL 20mL/hr(終了時残破棄)                                                                                                                                                                                            |
| ※①  | 10時    | <div> <div>同時に<br/>側管より</div> <div>           カロナール内服 → 別途内服オーダー<br/>           ポララミン注5mg 1A<br/>           ガスター注20mg 1A<br/>           オルガドロン注19mg 1V<br/>           5%ブドウ糖 100mL         </div> <div>30分</div> </div> |
| ②   | 10時30分 | <div> <div>●サークリサ【      】mg</div> <div>5%ブドウ糖 250mL</div> <div>1時間15分</div> </div>                                                                                                                                      |

## ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名        | 標準投与量                              |           |
|------------|------------------------------------|-----------|
| サークリサ      | 10mg/kg                            | mg/Body   |
| カイプロリス     | 《Day1,2》 20mg/m <sup>2</sup>       |           |
|            | 《Day8,9,15,16》 56mg/m <sup>2</sup> |           |
| オルガドロン     | mg/m <sup>2</sup>                  | 19mg/Body |
| レナデックス(経口) | mg/m <sup>2</sup>                  | 20mg/Body |

## ■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- サークリサ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

○サークリサの投与速度 (詳細は点滴速度換算表参照)

《3回目投与以降》

200mL/hr

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |