

## IsaKd療法【1コース目】(Day2,9,16)

【血液内科】246-2,9,16【多発性骨髄腫】  
(第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

## ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day        | 1  | 2  | 8  | 9  | 15 | 16 | 22 | 23 | ~28 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日        | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /   |
| サークリサ      | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |
| カイプロリス     | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |
| オルガドロン     | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |
| レナデックス(経口) | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  |     |

## ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間 |                                                                                                                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※①  | 10時  | 5%ブドウ糖 250mL 1時間                                                                                               |
| ※①  | 10時  | 同時に<br>側管より ●カイプロリス【      】mg<br>注射用水<br>5%ブドウ糖 100mL 30分<br>※カイプロリス10mgは注射用水5mLで溶解<br>※カイプロリス40mgは注射用水20mLで溶解 |

## ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名        | 標準投与量                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| サークリサ      | 10mg/kg      mg/Body                                               |
| カイプロリス     | 《Day1,2》 20mg/m <sup>2</sup><br>《Day8,9,15,16》 56mg/m <sup>2</sup> |
| オルガドロン     | mg/m <sup>2</sup> 19mg/Body                                        |
| レナデックス(経口) | mg/m <sup>2</sup> 20mg/Body                                        |

## ■注意・確認事項

○カイプロリス投与中または投与開始後24時間以内に  
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |