

IsaKd療法【2コース目以降】(Day2,8,9,16)

【血液内科】247-2,8,9,16【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	15	16	22	23	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
サークリサ	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
カイプロリス	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
レナデックス(経口)	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	5%ブドウ糖 250mL 1時間
※①	10時	同時に 側管より ●カイプロリス【 】mg 注射用水 5%ブドウ糖 100mL 30分 ※カイプロリス10mgは注射用水5mLで溶解 ※カイプロリス40mgは注射用水20mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サークリサ	10mg/kg	mg/Body
カイプロリス	56mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	19mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m ²	20mg/Body

■注意・確認事項

○カイプロリス投与中または投与開始後24時間以内に
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師