

# IsaPd療法【1コース目】(Day1)

## 【血液内科】248-1【多発性骨髄腫】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
サークリサ	↓	↓	↓	↓	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	
ポマリスト	経口: Day1-21				休薬

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サークリサ	10mg/kg	mg/Body
オルガドロン	mg/m <sup>2</sup>	38mg/Body
ポマリスト(経口)	mg/m <sup>2</sup>	4mg/Body

◎75歳以上: 19mg/body  
 ※Day1~Day21服用(7日間休薬)

### ■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- サークリサ投与中または投与開始後24時間以内に infusion reactionが起る場合があるので注意すること。
- サークリサの投与速度 (詳細は点滴速度換算表参照)

#### 《初回投与》

投与開始0-60分	25mL/hr
投与開始60-90分	50mL/hr
投与開始90-120分	75mL/hr
投与開始120-150分	100mL/hr
投与開始150-180分	125mL/hr
投与開始180分以降	150mL/hr

入力薬剤師	看護師	看護師