

IsaVRd療法【1コース目】(Day4,11,25,32)

【血液内科】250-4,11,25,32【多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール：6週ごとを1コースとする

Day	1	2	4	5	8	9	11	12	15	22	23	25	26	29	30	32	33	36	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
サークリサ	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
ボルテゾミブ	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬
オルガドロン	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
レナデックス(経口)	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬
レブラミド	経口:Day1-14									経口:Day22-35									

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	●ボルテゾミブ【 】mg 生食 1.2mL 皮下注射 ※ボルテゾミブ1Vを生食1.2mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サークリサ	10 mg/kg	mg/Body
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	19mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m ²	20mg/Body
レブラミド(経口)	mg/m ²	25mg/Body

◎75歳以上はデキサメタゾン週2回に減量する

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師