

# IsaVRd-Lite療法【1コース目】(Day22)

## 【血液内科】254-22【多発性骨髄腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
サークリサ	↓	↓	↓	↓	
ボルテゾミブ	↓	↓	↓	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	
レブラミド	経口: Day1-21				

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
※①	10時	生食 250mL 20mL/hr(終了時残破棄)
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A ガスター注20mg 1A オルガドロン注19mg 1V 生食 100mL 30分
②	10時30分	●サークリサ【 】mg 生食 250mL 1時間15分

### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サークリサ	10 mg/kg	mg/Body
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
オルガドロン	mg/m <sup>2</sup>	19mg/Body
レブラミド(経口)	mg/m <sup>2</sup>	25mg/Body

### ■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- サークリサ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- サークリサ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- サークリサの投与速度 (詳細は点滴速度換算表参照)

≪3回目投与以降≫

200mL/hr

入力 薬剤師	看護師	看護師