

テクベイリ療法【漸増期】(Day4)

【血液内科】261-4【多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	4	8	~14
施行日	/	/	/	/
テクベイリ	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 500mL 24時間
※①	10時	同時に 側管より
※①	10時	カロナール内服 → 別途内服オーダー レスタミン10mg 5T 内服 デキサート注6.6mg 2V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②	11時	●テクベイリ皮下注【 】mg 皮下注射

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
テクベイリ	《Day1》 0.06 mg/kg mg/Body
	《Day4》 0.3 mg/kg mg/Body
	《Day8》 1.5 mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

○テクベイリ投与によりサイトカイン放出症候群(CRS)が起こる場合があるので注意すること。
CRS予防のため、テクベイリ投与開始1時間前に副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師