## ロイナーゼ療法

## ■エンボス

## 【血液内科】61【悪性リンパ腫・急性白血病】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

 身長:
 cm
 体重:
 kg

 体表面積:
 m²
 Cr:
 mg/dL

ノジメン	下記が1コースの投与スケジ:	ュール : 週ごとを1コース
Day	1	~
施行日	/	
ロイナーセ	<b>.</b> ↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

_■技子順序 スマークは向ダイミング技子楽のり					
滴下順	投与時間				
1	10時	生食 50mL 10分			
2	10時10分	●ロイナーゼ【 】KU			
		注射用水 20mL			
		生食 500mL 2時間			
		※ロイナーゼ1Vを注射用水5mLで溶解			
3	12時10分	★ FOI 10/\ ¬=…>			
3	12時10万	<u>生食 50mL</u> 10分 フラッシュ			
<u> </u>	ļ				

■投与量	※投与量の参考	
薬剤名	標準投与量	
ロイナーゼ	50∼200 KU/kg	

## ■注意·確認事項

〇ショックが現れる恐れがあるため、ロイナーゼ投与に先立って皮内反応試験(調製・投与方法等は別紙参照) を実施することが望ましい。

入力 薬剤師	看護師	看護師