

# GB療法【1コース目】(Day1)

## 【血液内科】75-1【非ホジキンリンパ腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	22	~28
施行日	/		/	/	/	/
ガザイバ	↓	休薬	↓	↓	休薬	
トレアキシソ	↓	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	投与速度
※①	10時	ソルデム3A 500mL	7時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A プレドニン注20mg 5A 生食 100mL	30分
②	10時30分	●ガザイバ【 】mg 生食 250mL	投与速度は「■注意事項」参照
③	15時30分	グラニセトロンバッグ 100mL	30分
④	16時	●トレアキシソ【 】mg 生食 250mL	1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ガザイバ	mg/m <sup>2</sup> 1000mg/Body
トレアキシソ	90mg/m <sup>2</sup> mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ガザイバ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- ガザイバ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- ガザイバの投与速度: 30分毎に速度を速める(最終的に100mL/hrまで)  
 Day1 : 12mL/hr ⇒ 25mL/hr ⇒ 37mL/hr ⇒ 50mL/hr ⇒ 62mL/hr ⇒ 75mL/hr ⇒ 87mL/hr ⇒ 100mL/hr  
 Day8及びDay15 : 25mL/hr ⇒ 50mL/hr ⇒ 75mL/hr ⇒ 100mL/hr
- トレアキシソは調製後6時間以内に投与を終了すること。

入力薬剤師	看護師	看護師