

GB療法【2コース目以降】(Day1)

【血液内科】76-1【非ホジキンリンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	22	~28
施行日	/		/	/	/	/
ガザイバ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
トレアキシシ	↓	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A プレドニン注20mg 5A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●ガザイバ【 】mg 生食 250mL 投与速度は「■注意事項」参照
③	12時45分	グラニセトロンバッグ 100mL 30分
④	13時15分	●トレアキシシ【 】mg 生食 250mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ガザイバ	mg/m ² 1000mg/Body
トレアキシシ	90mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ガザイバ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- ガザイバ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- ガザイバ投与速度(第1サイクルの投与でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合)
30分毎に速度を速める(最終200mL/hrまで)
25mL/hr ⇒ 100mL/hr ⇒ 200mL/hr
- トレアキシシは調製後6時間以内に投与を終了すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師