

MCEC療法(Day7)

【血液内科】81-7【非ホジキンリンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
サイメリン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ペプシド	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	12時	グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	12時25分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL 全開
③	12時30分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 3時間
④	16時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL 全開
⑤	20時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL 全開
⑥	22時	グラニセトンバッグ 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
サイメリン	200mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	300mg/m ²	mg/Body
ペプシド	250mg/m ² × 2	mg/Body
エンドキサン	50mg/kg	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- ウロミテキサンはエンドキサン投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。
- ウロミテキサンの1回量はエンドキサンの40%の量 (mg)