

ガザイバ療法(維持療法)
【血液内科】84【非ホジキンリンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール：8週ごとを1コースとする									
Day	1	8	15	22	29	36	43	50	~56
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ガザイバ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 4時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服→別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A プレドニン注20mg 5A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●ガザイバ【 】mg 生食 250mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量	※投与量の参考
薬剤名	標準投与量
ガザイバ	mg/m ² 1000mg/Body

- 注意・確認事項
- 維持療法は最長2年間とする。
 - 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
 - ガザイバ投与時は輸液ポンプを使用すること。
 - ガザイバ投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
 - ガザイバ投与速度(第1サイクルの投与でGrade3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合)
30分毎に速度を速める(最終200mL/hrまで)
25mL/hr ⇒ 100mL/hr ⇒ 200mL/hr

入力 薬剤師	看護師	看護師