

A+CHP療法

【血液内科】85【末梢性T細胞リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
ドキソルビシン	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	
アドセトリス	↓	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	↓	経口: Day2-5	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に 側管より プレドニン注20mg 5A グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●ドキソルビシン【 】mg 生食 100mL 30分
③	11時	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間
④	13時	●アドセトリス【 】mg 注射用水 生食 100mL 30分 ※アドセトリス1V当り注射用水10.5mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ドキソルビシン	50mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	750mg/m ²	mg/Body
アドセトリス	1.8mg/kg	mg/Body
プレドニン	mg/m ²	100mg/Body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師