

ジフォルタ療法

【血液内科】87【末梢性T細胞リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン		下記が1コースの投与スケジュール：7週ごとを1コースとする									
Day	-10	1	8	15	22	29	36	43	~49		
施行日		/	/	/	/	/	/	/	/		
ジフォルタ		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬		
パンビタン末(経口)		初回投与の10日以上前から、葉酸として1日1回1.0~1.25mgを連日経口投与する。									
メコバラミン注(筋注)	↓	メコバラミン注(ビタミンB12)：初回投与の10日以上前から、1回1mgを8~10週ごとに筋肉内投与する。									

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間		
※①	10時	生食 100mL 1時間	
※①	10時	同時に 側管より	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	10時30分		●ジフォルタ【 】mg 生食 30mL 5分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ジフォルタ	30mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 副作用を軽減するため、葉酸・ビタミンB12を下記のように投与する。
- 葉酸：ジフォルタ初回投与の10日以上前から、葉酸として1日1回1.0~1.25mgを連日経口投与。
- ジフォルタ投与終了日から30日間は投与を継続。
- ビタミンB12：ジフォルタ初回投与の10日以上前から、ビタミンB12として1回1mgを8~10週ごとに筋肉内投与。
- ジフォルタ投与中は投与を継続。

入力 薬剤師	看護師	看護師