ダルビアス療法

■エンボス

【血液内科】88【末梢性T細胞リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

 身長:
 cm
 体重:
 kg

 体表面積:
 m³
 Cr:
 mg/dL

Day 1 2 3 4 5 ~21 施行日 / / / / /	【レジメン 下記が1	コースの	投与:	スケジ	ューノ	レ:	3週ごとを1コースとする
施行日 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Day	1	2	3	4	5	~21
<i>I</i> -2 11 2 − 2 − 2 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 −	施行日	/	/	/	/	/	
ダル ロア ム	ダルビアス	\downarrow	\downarrow	Ţ	\downarrow	\downarrow	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

■投サ順	· / · /	は何ダイミング投手業のグ
滴下順	投与時間	
1	10時	生食 50mL 10分
		↓
2	10時10分	●ダルビアス【 Img
		注射用水
		生食 250mL 1時間
		※ダルビアス1V当り注射用水1.8mLで溶解
		↓
3	11時10分	生食 50mL 10分 フラッシュ
		10% 00%
		↓
4	11時20分	へパリンNaロック用シリンジ 1本(Day5は不要)
	11111207	

■投与量	※投与量の参考			
薬剤名	標準扎	殳 与量		
ダルビアス	300mg/m2	mg/Body		

- ■注意·確認事項
- 〇中心静脈から投与すること。
- 〇ヒ素含有製剤(残液は要回収)

入力 薬剤師	看護師	看護師