

レミト口療法

【血液内科】89【末梢性T細胞リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
レミトロ	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 500mL 3時間
※①	10時	同時に 側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	11時00分	●レミトロ【 】μg 注射用水 生食 500mL 1時間 ※レミトロ1V当り注射用水2.1mLで溶解 (溶解後濃度: 150 μg/mL)

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
レミトロ	9 μg/kg μg/Body

■注意・確認事項

- インラインフィルターは使用しないこと。
- 毛細血管漏出症候群を軽減させるために、レミトロ投与前後に生食等の輸液を行うことを考慮すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師