

mLSG15療法(Day1)

【血液内科】90-1【成人T細胞白血病リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	16	17	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ドキソルビシン	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
サイメリン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
フィルデシン	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に 側管より プレドニン注【 】mg グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●ドキソルビシン【 】mg 生食 100mL 30分
④	11時15分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコビン	1mg/m ² mg/Body →最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	(D1) 40mg/m ² mg/Body
	(D8) 30mg/m ² mg/Body
エンドキサン	350mg/m ² mg/Body
サイメリン	60mg/m ² mg/Body
フィルデシン	2.4mg/m ² mg/Body
ベプシド	100mg/m ² mg/Body
カルボプラチン	250mg/m ² mg/Body
プレドニン	40mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こす
ことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師