

# mLSG15療法(Day15)

## 【血液内科】90-15【成人T細胞白血病リンパ腫】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	16	17	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキソルビシン	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
サイメリン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
フィルデシン	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
ペプシド	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬
カルボプラチン	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
プレドニン	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	時間
※①	10時	ソルデム3A 500mL	5時間
※①	10時	同時に側管より プレドニン注【     】mg グラニセトロンバッグ 100mL	30分
②	10時30分	●フィルデシン【     】mg 生食 50mL	15分
③	10時45分	●ペプシド【     】mg 5%ブドウ糖 500mL	2時間
④	12時45分	●カルボプラチン【     】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	1mg/m <sup>2</sup>	mg/Body →最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	(D1) 40mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
	(D8) 30mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エンドキサン	350mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
サイメリン	60mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
フィルデシン	2.4mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ペプシド	100mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
カルボプラチン	250mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
プレドニン	40mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師