

mLSG(髄注)療法

■エンボス

【血液内科】91【成人T細胞白血病リンパ腫】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	~
施行日	/	
メソトレキセート	↓	
キロサイド	↓	
プレドニン	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間					
①	10時	<table border="1"><tr><td>●メソトレキセート 15mg</td></tr><tr><td>●キロサイド 40mg</td></tr><tr><td>プレドニン注 10mg</td></tr><tr><td>生食</td></tr></table> 髄腔内注入 ※全量5mLとする	●メソトレキセート 15mg	●キロサイド 40mg	プレドニン注 10mg	生食
●メソトレキセート 15mg						
●キロサイド 40mg						
プレドニン注 10mg						
生食						

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
メソトレキセート	mg/m ²	15mg/Body
キロサイド	mg/m ²	40mg/Body
プレドニン	mg/m ²	10mg/Body

■注意・確認事項

○第1・3・5コースの骨髓回復期に投与

入力 薬剤師	看護師	看護師