

DC+キイトルーダ療法

【婦人科】104【進行再発子宮体癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	
ドセタキセル	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●キイトルーダ【 】mg 生食 50mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセロンバッグ 100mL 30分
⑤	●ドセタキセル【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
⑥	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
⑦	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キイトルーダ	mg/m ² 200mg/Body
ドセタキセル	70 mg/m ² mg/Body
カルボプラチン	AUC=5 mg/Body

■注意・確認事項

○ドセタキセル点滴開始から約10分間は、過敏症状が出現しやすいので、250mL/2時間ペースで投与しベッドサイドにて観察すること。

○点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師