

ベンリスタ療法

■エンボス

【免疫内科】18【全身性エリテマトーデス】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール: 初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与

Day	1	~28 (※3回目までは14)
施行日	/	
ベンリスタ	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	生食 50mL 10分
②	10時10分	●ベンリスタ【 】mg 注射用水 生食 250mL 投与速度は「■注意事項」参照 ※ベンリスタ120mgは注射用水1.5mLで溶解 ※ベンリスタ400mgは注射用水4.8mLで溶解 (溶解後濃度: 80mg/mL)
③	11時10分	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ベンリスタ	10mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

○初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与。

○ベンリスタの投与速度

【初回】30mL/hrで開始 ⇒ 15分後 250mL/hrへ

【2回目以降】250mL/hr 1時間で投与

入力 薬剤師	看護師	看護師