

アクテムラ(2週間隔)療法

■エンボス

【免疫内科】2

【全身型若年性特発性関節炎・成人スチル病・キャッスルマン病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	/
アクテムラ	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	生食 50mL 10分 ↓ ●アクテムラ【 】mg 生食 100mL 投与速度は「■注意事項」参照 ↓ 生食 50mL 10分 フラッシュ
②	10時10分	
③	11時10分	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アクテムラ	8mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 輸液ポンプ使用。投与開始時は緩徐に点滴静注を行い、アナフィラキシー様症状がないことを確認後、点滴速度を速め、1時間程度で投与を終了する。
《アクテムラの投与速度》
30mL/hrで開始 ⇒ 15分後 160mL/hrへ

入力 薬剤師	看護師	看護師