

## ランダ+Weeklyイリノテカン療法(Day1)

## 【呼吸器科】25-1【小細胞肺癌】

## (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 診療科:  | 病棟:            |     |       |
| 医師名:  | 印              |     |       |
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

## ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :4週ごとを1コースとする

| Day    | 1 | 2  | 3  | 8  | 15 | 22 | ~28 |
|--------|---|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日    | / | /  | /  | /  | /  | /  | /   |
| ランダ    | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| イリノテカン | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓  | ↓  | 休薬 |     |

## ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 生食 500mL 1時間30分                                                                          |
| ②   | アロカリス注235mg 1V<br>パロノセトロン注0.75mg 1V<br>デキサート注1.65mg 2A<br>デキサート注6.6mg 1V<br>生食 100mL 30分 |
| ③   | ●イリノテカン【 】mg<br>生食 500mL 1時間30分                                                          |
| ④   | ●ランダ【 】mg<br>生食 500mL 2時間                                                                |
| ⑤   | ソルデム3A 500mL 1時間30分                                                                      |
| ⑥   | マンニトールS 300mL 1時間                                                                        |
| ⑦   | フロセミド注20mg 1A<br>生食 500mL 1時間30分                                                         |

## ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量                        |
|--------|------------------------------|
| ランダ    | 60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body |
| イリノテカン | 60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body |

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |

## ■注意・確認事項

○イリノテカンは腸閉塞の患者には禁忌。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。