## ランダ+Weeklyイリノテカン療法(Day8,15)

## 【呼吸器科】25-8,15【小細胞肺癌】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	田

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>*</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン	下記が1コ	ースの	投与ス	スケジュール	:4週ごとを	1コースとす	る
Day	1	2	3	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	
ランダ	<b>↓</b>	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
イリノテカン	<b>,</b> ↓	休薬	休薬	<b>1</b>	<b>↓</b>	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

■投于顺序》	ペイーグは向け	ダイミング 投与楽めり
滴下順		. <u></u>
(1)		アロカリス注235mg 1V
		デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
		<u>【グラニセトロンバッグ 100mL </u> 30分
		<b>↓</b>
2		●イリノテカン 【
		<b>↓</b>
3		生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量※投与量の参考薬剤名標準投与量ランダ60 mg/m²mg/Bodyイリノテカン60 mg/m²mg/Body

## ■注意·確認事項

- 〇イリノテカンは腸閉塞の患者には禁忌
- 〇デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- ○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師