

フェスゴ+エリ布林療法【初回】(Day1)

【外科】280-1【乳癌】

(第 コース目)

■エンボス

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
フェスゴIN	↓	休薬	休薬	
エリ布林	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	●フェスゴ配合皮下注IN 15mL 皮下注射 ※大腿部に8分以上かけて投与(目安投与速度:2mL/分) ※投与終了後、30分の経過観察を行うこと
②	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
③	●エリ布林【 】mg 生食 50mL 5分
④	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
フェスゴIN	1回1V(15mL)
エリ布林	1.4 mg/m ² mg/Body

※ペルツズマブ:1200mg、トラスツズマブ:600mg

■注意・確認事項

- フェスゴの注射部位は前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと
- 投与開始前に心エコー検査必須。治療継続中は適宜フォローする
- エリ布林は肝機能障害を有する患者には、減量を考慮すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師