

サイラムザ+イリノテカン療法【30分】

【外科】291【胃癌 進行・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	
サイラムザ	↓	休薬	
イリノテカン	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V ポラミン注 1A デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	●サイラムザ【 】mg 生食 250mL 30分
③	●イリノテカン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間30分
④	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
サイラムザ	8 mg/kg
イリノテカン	150 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- サイラムザは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は30分間で行っても良い。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- イリノテカンは腸閉塞傾向の患者には禁忌
- 進行・再発大腸癌においては、サイラムザ+FOLFIRI療法投与中の患者において副作用等で5-FUを投与できない場合に使用する。

入力 薬剤師	看護師	看護師