

キイトルーダ+ハーセプチン+SOX(130mg/m²)療法【1コース目】

【外科】292【胃癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	
エルプラット	↓	休薬	休薬	
エスワン	経口:Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●キイトルーダ注【 】mg 生食 50mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトンバッグ 100mL 30分
⑤	●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 1時間30分
⑥	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A 2時間
⑦	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
キイトルーダ注	200mg/Body	
ハーセプチン注	8 mg/kg	mg/Body
エルプラット注	130 mg/m ²	mg/Body
エスワン	※投与量の参考	

※エスワンの1日投与量

<1.25	80mg/Body/分2
1.25~<1.5	100mg/Body/分2
1.5≤	120mg/Body/分2

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- エスワンは2週投与1週休薬。
- 初回投与前、初回3~6ヶ月毎に心エコーを行うこと。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。

入力 薬剤師	看護師	看護師