

オプジーボ[®](NIVO)+ヤーボイ[®](IPI)療法

【外科】298【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
オプジーボ	↓	休薬	休薬	
ヤーボイ	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●オプジーボ注 【 】mg 生食 100mL 30分
③	生食 100mL 30分
④	●ヤーボイ注 【 】mg 生食 50mL 30分
⑤	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オプジーボ注	240mg/body
ヤーボイ注	1mg/kg mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- オプジーボ+ヤーボイ療法を4回投与し、その後オプジーボ単独(240mgを2週間間隔または480mgを4週間間隔を投与する。