

FLOT療法

【外科】299【胃癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	~14
施行日	/	/	
ドセタキセル	↓	休薬	
エルプラット	↓	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	
5-FU	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	●ドセタキセル【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
③	生食 50mL 10分
※④	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 2時間
※④	同時に 側管より ●アイソボリン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 2時間
⑤	生食 50mL 10分
⑥	●5-FU注【 】mg 生食 500mL 24時間
⑦	生食 50mL 10分フラッシュ
5FU投与 終了後	

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ドセタキセル注	50 mg/m ² mg/Body
エルプラット注	85 mg/m ² mg/Body
アイソボリン注	200 mg/m ² mg/Body
②5-FU注	2600 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。

○エルプラットは塩化物・塩基性溶液との混和は不可

入力 薬剤師	看護師	看護師