

オプジーボ+GEM+CDDP療法(Day8)

【泌尿器科】57-8【尿路上皮癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	
オプジーボ	↓	休薬	休薬	休薬	
ゲムシタビン	↓	休薬	↓	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●ゲムシタビン【 】mg 生食 100mL 30分
③	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オプジーボ注	360mg/body
ゲムシタビン	1000 mg/m ² mg/Body
ランダ	70 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○最大6コース実施。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師