

リツキサン療法【1コース目】

【免疫内科】6

【顕微鏡的多発血管炎・多発血管炎性肉芽腫症・全身性強皮症・ループス腎炎】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1週ごとを1コースとする

Day	1	~7
施行日	/	/
リツキサン	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に 側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ボラミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●リツキサン【 】mg 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキサン	375mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- リツキサン投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキサンの投与速度
25mL/hr 1時間、50mL/hr 1時間、100mL/hr 1時間、以降 200mL/hr
- 1週間間隔で4回投与する

入力 薬剤師	看護師	看護師