

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

S-1+ランダ+ハーセプチン(SH)療法【30分】

【内科】75【胃癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
エスワン	経口: Day1~Day14			
ランダ	↓	休薬	休薬	
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	

■投与タイムテーブル

投与時間		
10時00分		イメンドカプセル125mg 1Cap パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 10分
10時10分		●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 30分
10時40分		KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 60分
11時40分		マンニトールS 300mL 30分
12時10分		●ランダ【 】mg 生食 500mL 60分
13時10分		KCL注10mEq 生食 500mL 60分

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エスワン	※参照
ランダ	60 mg/m ² mg/Body
ハーセプチン	6 mg/kg mg/Body

※エスワンの1日投与量

BSA<1.25	80mg/日
1.25≤BSA<1.5	100mg/日
1.5≤BSA	120mg/日

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- エスワンは2週連日投与、1週休薬。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2,3に投与する。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。