

## アービタックス＋Weeklyイリノテカン療法【Day8～22】

【外科】96-8,15,22【進行・再発大腸癌】

(第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

## ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

| Day     | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | ~42 |
|---------|---|---|----|----|----|----|-----|
| 施行日     | / | / | /  | /  | /  | /  |     |
| アービタックス | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |     |
| イリノテカン  | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |

## ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | <div>アロカリス注235mg 1V<br/>デキサート注1.65mg 2A<br/>ポラミン注5mg 1A<br/>生食 100mL</div> <div>30分</div> |
| ②   | <div>●アービタックス【      】mg<br/>生食 250mL</div> <div>1時間</div>                                 |
| ③   | <div>グラニセロンバッグ 100mL</div> <div>30分</div>                                                 |
| ④   | <div>●イリノテカン【      】mg<br/>5%ブドウ糖液 250mL</div> <div>1時間30分</div>                          |
| ⑤   | <div>生食 50mL</div> <div>10分フラッシュ</div>                                                    |

## ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名            | 標準投与量                        |
|----------------|------------------------------|
| アービタックス(初回)    | 400mg/m <sup>2</sup> mg/Body |
| アービタックス(2回目以降) | 250mg/m <sup>2</sup> mg/Body |
| イリノテカン         | 100mg/m <sup>2</sup> mg/Body |

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |

## ■注意・確認事項

- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m<sup>2</sup>で投与。それ以降は250mg/m<sup>2</sup>で投与。
- イリノテカンは腸閉塞傾向の患者には禁忌。