

術前イミフィンジ+GEM+CDDP療法(Day1)

【泌尿器科】60-1【膀胱癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする					
Day	1	2	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	
イミフィンジ	↓	休薬	休薬	休薬	
ゲムシタビン	↓	休薬	↓	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●イミフィンジ注【 】mg 生食 100mL 1時間
③	生食 50mL 10分
④	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
⑤	生食 50mL 10分
⑥	●ゲムシタビン【 】mg 生食 100mL 30分
⑦	生食 50mL 10分
⑧	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
⑨	マンニトールS 300mL 30分
⑩	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑪	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
イミフィンジ注	1500mg/body
ゲムシタビン	1000 mg/m ² mg/Body
ランダ	70 mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。また、day1のランダの投与量を調節すること。
- 最大4コース実施。
- 体重30kg以下の場合、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgとする。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。