

ダラキューロ【1コース目】(Day1)

【血液内科】280-1【高リスクくすぶり型多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 8 | 15 | 22 | ~28 |
|--------|---|---|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | / | / |
| ダラキューロ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間 | |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 10時 | ポララミン2mg 1錠 内服 デカドロン4mg 5錠 内服 カロナール300 2錠 内服 モンテルカスト10mg 1錠 内服 <div style="float: right; margin-top: -40px;">} → 別途内服オーダー</div> |
| ① | 11時 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">●ダラキューロ配合皮下注 1V</div> 皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下 に約3~5分かけて投与 |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|--------|-------------------------------|
| ダラキューロ | 1回 1V (15mL) ※ダラツムマブとして1800mg |

■注意・確認事項

- ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- 最長39サイクル、36ヶ月または疾患進行のいずれか早い時点まで投与。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |