

ダラキューロ【7コース目以降】

【血液内科】283【高リスクくすぶり型多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
ダラキューロ	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
	10時	ポララミン2mg 1錠 内服 デカドロン4mg 3錠 内服 カロナール300 2錠 内服 } → 別途内服オーダー
①	11時	●ダラキューロ配合皮下注 1V 皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下 に約3~5分かけて投与

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ダラキューロ	1回 1V (15mL) ※ダラツムマブとして1800mg

■注意・確認事項

- ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- 最長39サイクル、36ヶ月または疾患進行のいずれか早い時点まで投与。

入力 薬剤師	看護師	看護師